

Coldrex® Hot Drink

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Coldrex Hot Drink, poeder voor drank

paracetamol 500 mg / vitamine C 30 mg

Coldrex Hot Drink

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger?

Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Coldrex Hot Drink en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Coldrex Hot Drink en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

- Coldrex Hot Drink behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

- Coldrex Hot Drink wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, in geval van:

- Lever- of nierfunctiestoornissen.
- Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren).

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

- Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever).
- Syndroom van Gilbert.
- Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie.
- Hemolytische anemie.
- Uitdroging.
- Ondergewicht of ondervoeding.
- Regelmatig alcoholgebruik.
- Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).
- Een infectie die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt.

Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (= 4 zakjes Coldrex Hot Drink).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Mogelijk moet u dit geneesmiddel in zijn geheel vermijden of de hoeveelheid paraceta- mol die u gebruikt, beperken.

Kinderen

Coldrex Hot Drink is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Coldrex Hot Drink nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, wanneer u een van

de volgende geneesmiddelen gebruikt.

- Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)

- Bepaalde antidepressiva

- Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)

- Chlooramfenicol (een antibioticum)

- Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)

- Colestyramine (cholesterolverlagend middel)

- Warfarine en andere coumarines (bloedverducers)

- Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van aids)

- Salicylamide (een pijnstiller)

- Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)

- Lamotrigine

- Flucloxacilline (antibiotica), omdat dit kan leiden tot een ernstig risico op bloed- en vochtafwijkingen (metabole acidose met verhoogde anion gap) die dringend moeten worden behandeld. Ze kunnen met name voorkomen bij mensen bij wie de nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie), met bloedvergiftiging (sepsis wat tot beschadiging van organen kan leiden), ondervoeding, langdurig alcoholisme, en bij gebruik van de maximale dagelijkse doses paracetamol.

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap: Als het echt nodig is, mag u Coldrex Hot Drink tijdens de zwangerschap gebruiken.

Gebruik de laagst mogelijke dosering die de pijn of koorts minder maakt en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts of verloskundige als de pijn of koorts niet minder wordt of als u het vaker moet innemen.

Borstvoeding: hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor *korte tijd* worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Coldrex Hot Drink heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Coldrex Hot Drink bevat sucrose en natriumcitraat

Coldrex Hot Drink bevat 3 gram sucrose en 5,51 mg glucose per zakje en is daarom niet geschikt voor diabetici. Daarnaast bevat Coldrex Hot Drink per zakje 358 mg natriumcitraat, wat overeenkomt met ongeveer 85 mg natrium. Coldrex Hot Drink is daarom niet geschikt voor patiënten met een zoutarm dieet. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Leeftijd	Dosering	Hoe vaak?
Kinderen van 12 jaar (30 - 40 kg)	1 sachet	Maximaal 3 - 4 sachets per dag
Kinderen van 12 tot 15 jaar (40 - 55 kg)	1 sachet	Maximaal 4 - 6 sachets per dag
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar	1 - 2 sachets	Maximaal 6 sachets per dag

Kinderen:

- Coldrex Hot Drink is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Ouderen

Raadpleeg eerst uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, want ouderen hebben mogelijk een lagere dosis nodig.

Nierfunctiestoornissen

Raadpleeg uw arts voordat u dit middel gebruikt als er bij u onvoldoende werking van de nieren is vastgesteld.

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

Coldrex Hot Drink

^[1] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[2] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[3] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[4] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[5] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[6] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

^[7] Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u